

的发育, 在 20 天左右, 幼虫体长 1.5 厘米左右, 体色黄白, 头黑色, 有 6 对足, 足短而粗, 有钩状突起, 幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。

幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。

幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。

幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。幼虫在寄主植物上爬行时, 钩状突起能钩住寄主植物, 使幼虫不易脱落。